

MESURES DE GESTION DE RISQUE

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les éléments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en gélules d'appât permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés. Écouter les gestes d'appâtage selon les indications mentionnées dans la présente étiquette. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de succès d'efficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, portez-vous à un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. En cas d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse; d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes; d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-le avec le contenant du produit ou l'étiquette. En cas d'incident, contactez un centre antipoison. N° ORFILA (INRS): 01 45 42 59 59.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: « ne pas déplacer ni ouvrir », « contient un rodenticide », « KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS - N° AMM: FR-2019-0091 », « substance(s) active(s): Brodifacoum et ses sels d'incubation, contacter un centre antipoison N° ORFILA (INRS): 01 45 42 59 59 ». Danger pour la faune.

INSTRUCTIONS POUR ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Le port de gants est recommandé.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et ventilé, dans l'emballage commercial fermé et à l'abri de la lumière directe du soleil.

AUTRES INFORMATIONS: En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues, porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent aménageant et un colorant.



Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles pour résoudre les problèmes d'infestations massives de rongeurs.

RATS & SOURIS

KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS est un rodenticide prêt à l'emploi sous forme de blocs extrudés de 20g, conditionnés dans des sachets individuels, à base de Brodifacoum, substance active à prise unique, pour le contrôle des souris domestiques (*Mus musculus*) et des rats – rat brun et rat noir (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) du stade juvénile au stade adulte. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie. Le bloc contient des sucres et des composants d'origine alimentaire, qui rendent le produit appétant pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. La consistance du bloc rend l'appât attractif, grâce à l'appétit naturel des rongeurs à ronger; et le bœuf en paraffine rend l'appât particulièrement résistant et adapté à l'utilisation dans des conditions humides.

KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS possède un trou central afin d'être fixé fermement à l'intérieur des postes d'appâtage. Cette caractéristique à une double fonction: surveiller la consommation des appâts et réduire la possibilité que le bloc soit déplacé à l'extérieur des postes d'appâtage. **KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS** contient un agent aménageant pour aider à prévenir la consommation accidentelle par les enfants. **KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS** peut être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments, comme par exemple les maisons, les caves, les garages, les débarras et les jardins privés.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE - INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Méthode d'application: Appât en bloc prêt à l'emploi à utiliser uniquement dans les stations d'appâts. Catégorie d'utilisateur: Grand public.

Dose et fréquence d'application:

Contre les souris domestiques (*Mus Musculus*) - Utilisation à l'intérieur: Placer 20 - 40g d'appât par point d'appât. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres. Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments: Placer 100 - 200g d'appât par point d'appât. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres. Les stations d'appâtage ne doivent être inspectées que 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. **Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments:** Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des ornières alimentaires ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcourez, piles de modification, parcs d'engrangement, trous, tamiers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas omer les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de bloc pour le contrôle des souris domestiques (à l'intérieur) et des rats – rat brun et rat noir (à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments).

USAGE NON PROFESSIONNEL (GRAND PUBLIC)

KAPO CHOC RATS & SOURIS BLOCS - Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de bloc.

Contient 0,0025% m/m de Brodifacoum (n° CAS 56073-10-0)

UFI : G000-X0GD-900G-NAQS

Mentions de danger:

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (cancérogène) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P114 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur.



N° AMM : FR-2019-0091

Détenteur de l'AMM/Fournisseur:

Zapi S.p.A. via Terza Strada 12
35035 Conselve (PD) Italie
Tel. +39 049 5837727
www.zapispa.com - info@zapispa.com

Distribué par: S.A.S. BRUNEL CHIMIE REQUIES
CS BRUNEL - 7 SOUS TRAVERTIN, Cedex
Retrouvez plus d'informations sur le site
www.kapo.com

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

N° de lot / Date de fabrication - voir emballage

Fabrique en Europe

300g



80037