



Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles pour résoudre les problèmes d'infestations massives de rongeurs.

RATS & SOURIS

KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS est un appât rodenticide prêt à l'emploi, sous forme de grain conditionné en sachets individuels de 25 g, pour le contrôle des souris domestiques et des rats - rat brun et rat noir. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte. KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit.

KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS est un appât rodenticide sous forme de blé déconté, particulièrement appétant pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus, car il est enrichi avec des composants d'origine alimentaire et fabriqué avec la technologie SAT (Technologie d'Absorption Spéciale) permettant la distribution homogène de la substance active aussi bien à l'intérieur du grain que sur sa surface extérieure. Cet appât est idéal pour les traitements dans les situations où le régime alimentaire des rongeurs est principalement basé sur la consommation de grains, comme dans les bâtiments ruraux et postindustriels.

KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS contient un agent amérisant (Benzocate de ditionium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE - INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Catégorie d'utilisation : Grand public.

Dose et fréquence d'application :

Contre les souris domestiques (*Mus Musculus*) - Utilisation à l'intérieur :

- **Forte infestation :** jusqu'à 50 g d'appât par point d'appât tous les 2 mètres.
- **Faible infestation :** jusqu'à 50 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres.

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments :

- **Forte infestation :** jusqu'à 100 g d'appât par point d'appât tous les 5 mètres.
- **Faible infestation :** jusqu'à 100 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres.

Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments : Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés ; remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Lire et respecter les informations sur le produit, ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, papiers, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, tamiers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

MESURES DE GESTION DE RISQUE

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés. Étiqueter les postes d'appâtage selon les indications mentionnées dans la présente étiquette. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de réaction d'urgence à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE

POUR PRÉVENIR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical vétérinaire uniquement. En cas d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse ; exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes ; exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenu du produit ou l'étiquette. En cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA (INRS) 01 45 42 59 59.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « Ne pas déplacer ni ouvrir : contient un rodenticide - KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS, N° AMM : FR-2017-0105 ; substance active : Brodifacoum » en cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA (INRS) 01 45 42 59 59 ». Dangereux pour la faune.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON

EMBALLAGE : Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Le port de gants est recommandé.

CONDITIONS DE STOCKAGE : conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Stocker le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

Durée de conservation : 24 mois à compter de sa date de fabrication.

AUTRES INFORMATIONS : En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

N° de lot / Date de fabrication : voir emballage.

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de grain pour le contrôle des souris domestiques (à l'intérieur) et des rats - rat brun et rat noir (à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments) USAGE GRAND PUBLIC

KAPO CHOC RATS & SOURIS GRAINS - Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de grain

Contient 0,0029% m/m de Brodifacoum (n° CAS 56073-10-0)

UFI : VC00-Y07Y-H00F-9Q21

Mentions de danger :

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P260 Ne pas respirer les poussières. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur.

N° AMM : FR-2017-0105

Détenteur de l'AMM/Fournisseur :

Zapi S.p.A. via Terza Strada 12
35026 Conselve (Pd) Italie
Tél. +39 049 9597737
www.zapispa.com - info@zapispa.com



ATTENTION

Distribué par : S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex

Retrouvez plus d'informations sur le site
www.kapo.com

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel



150g
ED0435

